

悠悠[®]藥膏

治香港腳 **外用**

U.U.[®] Ointment

【成份】：Each gm contains：

有效成分及含量：Undecylenic Acid.....50 mg
Zinc Undecylenate.....200 mg

其他成份（賦形劑）：Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 400,
Polyethylene Glycol 4000, Fragrance AB-4015

【用途（適應症）】：治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬（香港腳）、股癬。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - （一）未滿六個月的嬰兒。
 - （二）曾經因本藥引起過敏症狀的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - （一）2歲以下小孩。
 - （二）深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - （一）12歲以下小孩。
 - （二）兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - （三）大面積之體表或皮膚深層感染者。
- 四、其他使用上注意事項：
 - （一）為防止兒童誤食請妥善保管。
 - （二）避免陽光直射。



委託者：尼斯可股份有限公司 新莊廠
新北市新莊區中正路715號
服務專線：0800-013988 www.nysco.com.tw

- (三) 勿超過建議劑量。
- (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- (五) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用施於眼睛四周或黏膜。
- (六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
- (七) 做用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- (八) 黴菌治療至少二星期，使用本藥須完成 程療程。
- (九) 此 產品對於頭皮或指甲無療效，對於頑固性之香港腳在夜晚使用悠悠藥膏，白天使用悠悠藥粉或悠悠外用液。

【用法用量】

使用量	一天2次
-----	------

醫師藥師藥劑生指示藥品。

- 先將患部以溫性肥皂與清水徹底洗淨，擦乾後塗抹於患部或經醫師指示使用，在治療中每天勤於更換鞋、襪對治療具有幫助。

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (一) 若有任何不適情況產生。
 - (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。
 - (三) 經治療後，一般黴菌一星期、股癬和體癬二星期、足癬四星期症狀會改善，若症狀沒有改善，或症狀有改善，但停藥後又復發。

【包裝】：1000公克以下鋁軟管，塑膠瓶裝。

【儲存方式】：儲存於25℃以下。

中央標準局註冊號碼25378號 衛署藥製字第043251號



MPA-U01-01-C

製造廠：西德有機化學藥品股份有限公司
 新北市三重區中正北路560巷36號